



**Jeśli chcesz sprawdzić czy u Twojego dziecka występują  
centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD)**

**Wypełnij Ankieta**

**Ankieta**

Proszę odpowiedzieć TAK lub NIE, czy obserwujecie Państwo u dziecka dane zachowanie, a następnie podsumować wyniki "TAK".

Lp.	Zachowanie/Objaw	TAK	NIE
1	Ma trudności z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas		
2	Ma trudności z rozumieniem szybkiej lub niewyraźnej mowy.		
3	Ma trudności z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych.		
4	Prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi.		
5	Dźwięki z otoczenia łatwo odwracają jego uwagę		
6	Przy prawidłowej inteligencji ma trudności w uczeniu się (problemy z nauką czytania, pisania, z nauką języków obcych).		
7	Nie potrafi dłużej utrzymać uwagi na zadaniu.		
8	Często wyłącza się, myślami jest gdzie indziej, sprawia wrażenie nieobecnego.		
9	W wywiadzie dziecko chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub wielokrotnie na ostre zapalenia ucha, miało przeziębiony migdałek gardłowy		
	SUMA ODPOWIEDZI "TAK"		

**Odpowiedzi**

Podsumowanie:

<= 3 odpowiedzi TAK - niskie ryzyko APD

3 - 5 odpowiedzi TAK - średnie ryzyko APD - sugerowane wykonanie testów diagnostycznych APD

>5 odpowiedzi TAK – duże prawdopodobieństwo występowania zaburzeń APD, wskazane przeprowadzenie dokładnych badań diagnostycznych

i zgłoś się do certyfikowanych  
terapeutów Neuroflow ATS  
w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgrowie:  
Magdalena Miałkowska i Anna Dudek

**Diagnoza wstępna i diagnozy kontrolne** między każdym etapem treningu  
**wykonywane są** w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgrowie **bezpłatnie**.

Przed diagnozą wstępną w Poradni **należy wykonać badanie słuchu – audiogram**  
(np. Przychodnia laryngologiczna „LARYNX” w Węgrowie  
ul. A. Mickiewicza 5, nr tel. 25 792 42 06).

Badanie słuchu należy wykonać najwcześniej 3 tygodni przed terminem badania w  
Poradni.